

●うがい薬の混合調製について

精製水 500mL + 含嗽用ハチアズレ 5 包 + グリセリン「マルイシ」 500mL (+キシロカイン液 4%) の混合処方について

Rp1

含嗽用ハチアズレ顆粒 (2g/包)	5 包 混
グリセリン「マルイシ」	60mL 混
滅菌精製水 500mL	1 本 混
(キシロカイン液 4%)	10mL 混)
適宜使用	1 回分
容器に入らない場合は、全量 500mL で調整可。	



【調製方法】

院内では、注射用水 500mL 容器内に、その他の処方薬剤を全て混合調製してお渡します。
院内内規として、容器内に他の処方薬剤が全て入らない場合は、適宜注射用水を減らして調整可能です。
※使用時は直接口を付けないように、別容器に移し替えて使用をお願いします。
※細菌汚染を鑑み、調製日より 1 週間程度で使い切るようご注意ください。

Rp2

含嗽用ハチアズレ顆粒 (2g/包)	5 包 混
グリセリン「マルイシ」	60mL 混
滅菌精製水 500mL	1 本 混
(キシロカイン液 4%)	10mL 混)
適宜使用	2 回分 ←
容器に入らない場合は、全量 500mL で調整可。	
自己で混合してうがいして下さい	

【調整方法】

複数回数分の場合は、処方回数分のセットをお渡ししてください。
(例)「2 回分」とコメントがある場合は、2 セット分お渡します。

※処方量としては、含嗽用ハチアズレ 10 包、グリセリン 120mL、滅菌精製水 1000mL です。)
※「自己で混合してうがいして下さい」の場合、院内では、2 セットとも患者さんが混合調製するか、1 セット目は薬剤師が混合調製し、残りのセットは患者が混合調製するかを、患者さんと相談します。患者自己調製を希望する場合は、注射用水 500mL、グリセリン 60mL (あればキシロカイン液 10mL)、含嗽用ハチアズレ顆粒 5 包をそれぞれ払い出し、使用直前に混合するように指導しています。